

広 報

2021年7月号

編集委員 江村公良 南出美佐 前原直之 伊原孝子 佐藤栄輔

※8月のレセプト提出日は **8月5日(木)** です

返戻を含む紙レセプト、猶予期間のフロッピーの提出はこの日をお願いいたします。
オンライン請求の場合でも、処方箋受付枚数・広域医療機関受付枚数の報告は継続してお願いしております。FAXでもよいのでよろしくお願いいたします。

※別添の「豊島区薬業協同組合」の広報もご覧ください

事業者用ごみ処理券の販売の案内もぜひご覧ください。

都薬関連およびその他の重要な連絡事項など

1) 東京都薬剤師会ホームページのSSL化に係るURLの変更について

東京都薬剤師会では、この度、ホームページのセキュリティ向上を目的に、ホームページのSSL化を実施することといたしました。

このため、ホームページのURLが次の通り変更となりますので、リンク等を設定されている場合には、ご修正くださいますようお願い申し上げます。

変更日：令和3年8月6日(金)午前11時より

変更前URL：<http://www.toyaku.or.jp/>

変更後URL：<https://www.toyaku.or.jp/>

(↑sが追加になります)

2) 脳卒中普及啓発ポスターの掲示について

東京都では、平成20年4月に「東京都脳卒中医療連携協議会」を設置し、脳卒中医療提供体制の整備、並びに都民への普及啓発活動を展開しています。

今般、脳卒中はできるだけ早く治療を始めることで、より高い効果が見込まれることから、患者やその周囲にいる家族等が発症時に適切な対応を行うことができるよう、都民に向けた周知用ポスターが作成されました。

薬局内への掲示を是非お願いいたします。

3) 日本医療薬学会「地域薬学ケア専門薬剤師制度」の

基幹施設調整依頼（マッチング）申請受付の開始について

日本医療薬学会が実施する「地域薬学ケア専門薬剤師制度」につきまして、7月15日より、研修希望者からの2021年度の基幹施設調整依頼（マッチング）の申請受付が開始されました。同制度の「地域薬学ケア専門薬剤師（がん）」等の認定を受けた常勤薬剤師の配置が、専門医療機関連携薬局の認定を受ける際の要件の一つになります。

詳細や申請方法等につきましては、下記サイトをご参照ください。

「2021年度 地域薬学ケア専門薬剤師 基幹施設調整依頼（マッチング）申請受付のお知らせ」
<https://www.jsphcs.jp/nintei/shinsei/c-shisetsu-c.html>

調整申込料振込期間：令和3年7月15日（木）～同8月23日（月）

申請受付期間：令和3年7月15日（木）～同8月29日（日）

豊島区薬剤師会からの連絡事項

1) 新型コロナワクチン配付事業について

当会は、新型コロナワクチンを接種拠点施設へ配付を行う事業を令和3年4月より行っております。拠点薬局をお引き受けいただいた会員の薬局には大変感謝申し上げます。

現在ワクチンが不足しており、新規受付を一時的に取りやめるなど混乱が生じておりますが、確実に2回目接種が行えるよう粛々と事業を継続しております。

引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

2) 高齢者の服薬情報提供事業へご協力のお願い

当会と豊島区との共同事業「高齢者の服薬情報提供事業」へのご協力をいただき誠にありがとうございます。

今年度も8月末に対象者への通知が発送される予定となっております。

残薬バッグの追加をご希望の場合は、池袋あうる薬局または事務局までご連絡ください。

なお、患者さんが来局され対応された先生は、引き続き翌月10日までに事務局まで所定の用紙にて報告をいただけますようお願いいたします。

詳細は別紙をご覧ください。

3) 【再掲】豊島区薬剤師会ホームページをぜひご覧ください

ホームページの内容が充実してきました。今後もより良いページを作りたいと思います。

（FAXや配布物などはいままで通りです。）

ホームページアドレス <http://www.toyoyaku.jp/>

会員専用ページに入るには、パスワード「t o s h i m a」を使ってください。

会員退会

落合 友美 (A)	北斗薬局大塚店	南大塚2-37-7
松田 明日香 (A)	アルファ薬局	池袋2-38-7
元谷 英志 (A)	元谷カテイ堂薬局	長崎4-30-2

会員変更

村田 優佳 (A) → 原田 由紀子 (A)	薬局マツモトキヨシ東長崎駅北口店
大久保 茉穂 (A) → 清水 宏美 (A)	春日通薬局
廣田 悦造 (A) → 廣田 悦造 (B)	ホーム薬局
大川 奈美 (B) → 大川 奈美 (A)	ホーム薬局

会員数報告

A会員	108名
B会員	13名
賛助会員	2名
合計	123名

保険部より

1) 「後発医薬品に関する流通及び対応状況に関する調査」(会員薬局の管理薬剤師へのアンケート)集計報告

東京都薬剤師会により6月30日まで行われていた後発医薬品に関する流通及び対応状況に関する調査の結果が報告されました。

こちらからご確認ください。(豊島区薬剤師会保険部グループページ内)

<https://drive.google.com/file/d/1UU5dVh7hW65zplZx0YnnXah1ld4GqLI0/view?usp=sharing>

2) アセトアミノフェンを含有する解熱鎮痛薬に係る対応について(処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売する場合のルールの再周知)


新型コロナワクチン接種後の発熱・痛みへの対応について、市販の解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェンだけでなく非ステロイド性抗炎症薬(イブプロフェンやロキソプロフェン)なども利用できると示されています。しかし、市販の解熱鎮痛剤が需給逼迫のため販売困難な状況となった場合には、処方箋医薬品以外の医療用医薬品により対応することも、選択肢の一つとして考えられるところです。その際は先日FAX又はメールにて配信済みの零售に関するルールの再確認をお願いいたします。

3) 要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いについて

東京都薬剤師会一般用医薬品等委員会では、使用者の適切な医薬品選択に資するべく、薬剤師による医薬品販売時の流れに沿って、法令遵守の観点及び薬学的知見から確認すべき事項及び手順を整理し、フローチャートを作成いたしました。つきましては、薬局の持つべき機能や、要指導医薬品・一般用医薬品の薬局における取扱いについて、本フローチャートの積極的な活用をお願い申し上げます。

別添2

要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認フローチャート
 【医薬品安全使用の推進とより適切な医薬品選択のために】



4) 「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について

本年8月1日より施行される薬局等の法令順守体制の整備等について、このたび厚生労働省医薬・生活衛生局長より「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」、また同局監視指導・麻薬対策課並びに総務課よりガイドラインに係る質疑応答集(Q&A)が示されました。

また日本薬剤師会ではこれらを踏まえ、薬局の現場に即した形で各薬局事業者が行うべきことをまとめた「薬局開設者における薬機法の法令遵守規定を守るための手引き(仮称)」を作成中であり、近日中にお示しする予定ですので、ガイドライン並びにQ&Aとあわせてご活用いただけますよう、併せてよろしくお願いたします。

「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」および「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)」は厚生労働省ホームページにて掲載予定です。豊島区薬剤師会保険部グループページ内に既に掲載しておりますので厚生労働省ホームページに掲載されるまではこちらからご確認ください。

<https://drive.google.com/file/d/1x3LCv30XHkYkX06QD1dW9NHh7tidXyr5/view?usp=sharing>

5) 「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」の一部訂正について

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月28日付け薬生審査発0328第15号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知)の別添「薬局製剤指針」において、一部誤りがあり訂正されましたのでご確認をお願いいたします。

別紙

薬局製剤指針 正誤表

(下線部分が訂正箇所)

訂正箇所			正	誤
一連番号	処方番号	該当箇所		
24	抗ヒスタミン薬3-②	用法及び用量	1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15才以上)1包1.4g、11才以上15才未満 大人の2/3、7才以上11才未満 大人の1/2、3才以上7才未満 大人の1/3	1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15才以上)1包1.0g、11才以上15才未満 大人の2/3、7才以上11才未満 大人の1/2、3才以上7才未満 大人の1/3
		規格及び試験方法	本品は定量するとき、塩酸プソイドエフェドリン(C ₁₀ H ₁₅ NO・HCl:201.69)3.9~4.7%、アリメマジン酒石酸塩[(C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S) ₂ ・C ₄ H ₆ O ₆ :746.99]0.11~0.13%及びカフェイン水和物(C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ ・H ₂ O:212.21)3.2~3.9%を含む。	本品は定量するとき、塩酸プソイドエフェドリン(C ₁₀ H ₁₅ NO・HCl:201.69)5.4~6.6%、アリメマジン酒石酸塩[(C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S) ₂ ・C ₄ H ₆ O ₆ :746.99]0.15~0.18%及びカフェイン水和物(C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ ・H ₂ O:212.21)4.5~5.5%を含む。
26	抗ヒスタミン薬5-②	用法及び用量	1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15才以上)1包1.2g、11才以上15才未満 大人の2/3、7才以上11才未満 大人の1/2、3才以上7才未満 大人の1/3	1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15才以上)1包1.0g、11才以上15才未満 大人の2/3、7才以上11才未満 大人の1/2、3才以上7才未満 大人の1/3
		規格及び試験方法	本品は定量するとき、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(C ₁₆ H ₁₉ ClN ₂ ・C ₄ H ₄ O ₄ :390.87)0.15~0.18%、塩酸プソイドエフェドリン(C ₁₀ H ₁₅ NO・HCl:201.69)4.5~5.5%、グリチルリチン酸(C ₄₂ H ₆₂ O ₁₆ :822.94)5.0~6.1%及びカフェイン水和物(C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ ・H ₂ O:212.21)3.8~4.6%を含む。	本品は定量するとき、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(C ₁₆ H ₁₉ ClN ₂ ・C ₄ H ₄ O ₄ :390.87)0.18~0.22%、塩酸プソイドエフェドリン(C ₁₀ H ₁₅ NO・HCl:201.69)5.4~6.6%、グリチルリチン酸(C ₄₂ H ₆₂ O ₁₆ :822.94)6.0~7.3%及びカフェイン水和物(C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ ・H ₂ O:212.21)4.5~5.5%を含む。

訂正箇所			正	誤
一連番号	処方番号	該当箇所		
39	鎮咳去痰薬12-③	用法及び用量	1回量を次のとおりとし、1日3回、4時間以上の間隔をおいて適宜服用する。 大人(15才以上)1包1.6g、11才以上15才未満 大人の2/3、8才以上11才未満 大人の1/2、5才以上8才未満 大人の1/3、3才以上5才未満 大人の1/4	1回量を次のとおりとし、1日3回、4時間以上の間隔をおいて適宜服用する。 大人(15才以上)1包1.5g、11才以上15才未満 大人の2/3、8才以上11才未満 大人の1/2、5才以上8才未満 大人の1/3、3才以上5才未満 大人の1/4

6) **【再掲】** 保険に関する情報は「豊島区薬剤師会保険部グループページ」をご覧ください

豊島区薬剤師会では保険関係の情報を細かく伝達するために、専用のページを設けております。URLより通知等の原文のPDFが閲覧可能です。

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Izvjl6An3GWZy3JDSlgLSOTVlawLkDRX>

学術部より

1) 豊島区薬剤師会学術勉強会のお知らせ

8月の勉強会は、例年通りお休みとなります。

2) 地区研修会のお知らせ

令和3年度第1回地区研修会を、9月11日（土）18：30～21：30に、Ike・BIZとしま産業振興プラザにて行う予定です。

詳細につきましてはあらためてご案内いたします。

3) PECS の稼働予定および各種申請に係る変更点等について

日本薬剤師研修センター／薬剤師研修・認定電子システム（PECS）の稼働予定につきましては、これまで9月を目途とされていましたが、10月下旬に延期になります。

薬学生実務実習関係

1) **【再掲】** 東京都薬剤師会 ‘学生向け’ 「とやく携帯メルマガ」 配信のお知らせ

東京都薬剤師会では、薬学生が、卒業後「東京都薬剤師会に入会しよう」という動機づけとなることを期待して、携帯電話によるメールマガジンの配信を開始します。実務実習受入薬局には案内ポスターを配布いたしますので、薬学生への案内をお願いいたします。なお、学生対象ですが、会員への配信も可能です。

池袋あうる薬局輪番

8月の輪番は以下の通りです。出勤よろしくお願いたします。

お願い ~輪番に入る7日前までに、出勤する方の氏名をあうる薬局まで連絡してください。

8月	日 勤 9:00 ~ 16:30		準 夜 16:00 ~ 22:00	
				受付事務入力兼任
1日(日)	チチブ薬局	あうる薬局	平和通り保健薬局	めぐみ薬局
7日(土)			ヒバリ薬局	駒込中央薬局
8日(日)	池袋駅前げんき薬局	さの薬局	雄飛堂薬局 池袋トキワ通り店	めぐみ薬局
9日(月)	いろり薬局東長崎店	こまごめ薬局	氣生薬局 上池袋薬局	あうる薬局
14日(土)			池袋萬盛堂薬局	ことり薬局
15日(日)	あけぼの薬局南長崎店	上池袋薬局	あかまつ薬局	佐藤薬局
21日(土)			かもめ薬局	ことり薬局
22日(日)	よつば薬局池袋西口店	雄飛堂薬局上池袋店	ポラム薬局	駒込中央薬局
28日(土)			アリス薬局大塚店	駒込中央薬局
29日(日)	あうる薬局	さの薬局	薬局マツモトキヨシ 東長崎駅北口店	ことり薬局

長崎休日診療所派遣

8月の輪番派遣は以下の通りです。出勤よろしくお願いたします。

8月	
1日(日)	長崎調剤薬局
8日(日)	長崎調剤薬局
9日(月)	長崎調剤薬局
15日(日)	エンゼル薬局
22日(日)	エンゼル薬局
29日(日)	椎名町薬局

医薬品・情報管理センター報告

○管理センター売上及び仕入

2021年6月売上金額 ￥2,709,859-

2021年6月仕入金額 ￥3,182,732-

○相談件数

6月	件数
薬局からの在庫確認	123
薬局からの処方箋応需	2
患者からの処方箋応需	4
医療用医薬品についての相談	5
医療機関の紹介	0
一般用医薬品についての相談	0
その他	6
合計	140

○池袋あうる薬局処方せん受付状況

6月 休日夜間 44枚

その他 283枚

○情報発信

コロナワクチンの基礎知識

■コロナワクチン接種のメリット

効果

最も高い発症予防効果が得られるのは、2回目を接種してから7日程度経って以降です。体の中である程度の抗体ができるまでに1~2週間程度かかるため、1回目の接種後から2週間程度は、ワクチンを受けていない方と同じくらいの頻度で発症してしまうことが論文等でも報告されています。また、臨床試験においてワクチンを2回接種した場合の有効率は約95%と報告されており、100%の発症予防効果が得られるわけではありません。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/>

20代を中心に、若い世代だと2割ほどが「新型コロナワクチンを打ちたくない」と考えているようです。20代の接種意義は以下のようになります。

1. 自分の体を守る

厚生労働省の集計でも、20代で入院治療などを必要とする陽性者は1万人を超え、死者も8人に上ります。

新型コロナウイルスについてはまだよくわかっていないことが多くあります。新しく生まれた変異株（デルタ株）の感染力は強いと指摘され、若い人の感染者も増えています。

2. 後遺症の問題

若い人が、高齢者より重症化することは少ないことは確かです。ただ、軽症で命にかかわることがなくても、回復後に嗅覚（きゅうかく）や味覚障害、脱毛、不定愁訴など、さまざまな後遺症に悩まされるリスクがあります。

3. 集団免疫を得る

感染症は、病原体（ウイルスや細菌など）が、その病原体に対する免疫を持たない人に

感染することで、流行します。ある病原体に対して、人口の一定割合以上の人が免疫を持つと、感染患者が出て、他の人に感染しにくくなることで、感染症が流行しなくなり、間接的に免疫を持たない人も感染から守られます。この状態を集団免疫と言い、社会全体が感染症から守られることとなります。

(参考資料) <https://www.cov19vaccine.mhlw.go.jp/qa/0019.html>

(参考資料) <https://www.asahi.com/articles/ASP7741HYP76ULBJ007.html>

■コロナワクチン接種のデメリット

コロナワクチンの副反応

主な副作用は、頭痛、関節や筋肉の痛み、注射した部位の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。

また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。

なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。

(参考資料) <https://www.mhlw.go.jp/content/000782621.pdf>

感染増強抗体の産生

- ・感染増強抗体の認識部位は現行のワクチン抗原にも含まれています。
- ・感染増強抗体が新型コロナウイルスのスパイクタンパク質の特定の部位に結合すると、抗体が直接スパイクタンパク質の構造変化を引き起こし、その結果、新型コロナウイルスの感染性が高くなることが判明しています。

- ・感染増強抗体は中和抗体の感染を防ぐ作用を減弱させることが判明しています。

(参考資料) https://www.amed.go.jp/news/release_20210525-02.html

※mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチン

mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンで注射するmRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていきます。また、mRNAは、人の遺伝情報（DNA）に組み込まれるものではありません。身体の中で、人の遺伝情報（DNA）からmRNAがつけられる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行で、逆にmRNAからはDNAはつくられません。こうしたことから、mRNAを注射することで、その情報が長期に残存したり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはないと考えられています。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0008.html>

■コロナワクチン接種できない人

- ・明らかに発熱している方（※1）
- ・重い急性疾患にかかっている方
- ・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症（※2）の既往歴のある方
- ・上記以外で、予防接種を受けることが不適當な状態にある方

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0025.html>

■コロナワクチン接種 注意が必要な人

- ・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方

- ・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
- ・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
- ・過去にけいれんを起こしたことがある方

・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方

ワクチン接種は体調のよいときに受けるのが基本ですので、特に基礎疾患のある方は、病状が悪化していたり、全身が衰弱している場合は避けた方がよいと考えられます。ご心配な方は、かかりつけ医にご相談ください。また、新型コロナワクチンは筋肉内に注射することから、抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある方は、接種後の出血に注意が必要とされています。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0026.html>

■コロナワクチン接種 妊婦中の人

米国では、既に10万人以上の妊婦が新型コロナワクチンを接種しています(2021年5月3日時点)。妊娠中にmRNAワクチン接種をした約3万5千人の女性の追跡研究の報告では、発熱や倦怠感などの副反応の頻度は非妊娠女性と同程度であり、胎児や出産への影響は認められませんでした。妊婦中の女性に対するmRNAワクチンの安全性や有効性に関するランダム化比較試験も現在行われています。米国CDCは、妊婦にも接種の機会が与えられるべきだとしております。これは、妊婦は同世代の妊娠していない女性と比べて、新型コロナウイルスに感染した場合に重症になりやすく、また早産や妊娠合併症、胎児への悪影響のリスクが上がるのが主な理由です。

妊娠中にmRNAワクチンを受けた方の臍帯血(胎児の血液と同じ)や母乳を調べた研究では、臍帯血にも母乳中にも新型コロナウイルスに対する抗体があることが確認されています。こうした抗体が、産後の新生児を感染から守る効果があることが期待されています。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0027.html>

■コロナワクチン接種 授乳中の人

授乳中の方も、新型コロナワクチンのmRNAワクチンを接種することができます。mRNAワクチンの成分そのものは乳腺の組織や母乳に出てこないと考えられています。

授乳中にmRNAワクチンを受けた方の母乳中に新型コロナウイルスに対する抗体が確認されています。こうした抗体が、授乳中の子供を感染から守る効果があることが期待されています。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0027.html>

■コロナワクチン接種 妊娠を計画している人

これから妊娠を計画されている方もmRNAワクチンを接種できます。mRNAワクチンが生殖器に悪影響を及ぼす報告はなく、ワクチンのために妊娠のタイミングを変更する必要はありません。もし接種後に妊娠していたことがわかった場合も、ワクチン接種が妊娠に悪影響を及ぼすという報告はありません。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0027.html>

■コロナワクチン接種 小児

ファイザー社の新型コロナワクチンでは、海外での臨床試験結果を踏まえ、令和3年6月1日より、当初16歳以上であった接種対象年齢を12歳以上に引き下げ、対象者を拡大することになりました。

(参考資料) <https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0044.html>

子どもへのワクチン接種の考え方

1) 重篤な基礎疾患のある子どもへの接種

国外では、神経疾患、慢性呼吸器疾患および免疫不全症を有する子どもの新型コロナウイルス感染症例において、COVID-19の重症化が報告されています。国内においても接種対象年齢となる基礎疾患のある子どもの重症化が危惧されますので、ワクチン接種がそれを防ぐことが期待されます。

しかし、高齢者と比べて思春期の子ども達、若年成人では接種部位の疼痛出現頻度は約90%と高く、接種後、特に2回目接種後に発熱、全身倦怠感、頭痛等の全身反応が起こる頻度も高いことが示されています（例：37.5℃以上の発熱は20代で約50%、50代で約30%、70代で約10%）³⁾。以上のことから、ワクチン接種を検討する際には本人および養育者に十分な接種前の説明と接種後の健康観察が必要であると考えます。

基礎疾患を有する子どもへのワクチン接種については、本人の健康状況をよく把握している主治医と養育者との間で、接種後の体調管理等を事前に相談することが望ましいと考えます。

2) 健康な子どもへの接種

12歳以上の健康な子どもへのワクチン接種は意義があると考えています。COVID-19予防対策の影響で子どもたちの生活は様々な制限を受け、子どもたちの心身の健康に大きな影響を与え続けています。小児COVID-19患者の多くは軽症ですが、まれながら重症化することがありますし、同居する高齢者の方がいる場合には感染を広げる可能性もあります。なお、子どもがワクチン接種をした場合、その後のマスク着用などの感染予防策の解除については、今後の流行状況などを踏まえて慎重に考える必要があります。

子どもへのワクチン接種は、先行する成人への接種状況を踏まえて慎重に実施されることが望ましく、また、接種にあたってはメリットとデメリットを本人と養育者が十分に理解していること、接種前・中・後におけるきめ細かな対応を行うことが前提であり、できれば個別接種が望ましいと考えます。やむを得ず集団接種を実施する際には、本人と養育者に対する個別の説明をしっかりと行う配慮が望まれます。ワクチン接種を希望しない子どもと養育者に対しては、特別扱いされないような十分な配慮が必要と考えます。

小児COVID-19が比較的軽症である一方で、国外での小児を対象とした接種経験等では、ワクチン接種後の発熱や接種部位の疼痛等の副反応出現頻度が比較的高いことが報告されています¹⁾。十分な接種前の説明がないまま副反応が発生することがないようにすることが重要です。

最近イスラエルや米国などから、若年男性におけるワクチン接種後の心筋炎の発症が報告されています

(参考資料) 日本小児科学会

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=374

広域病院処方せん受付状況報告

	都立大塚		豊島病院		長寿医療センター	
	件数	枚数	件数	枚数	件数	枚数
6月	1,107	1,204	50	59	80	99

理事会報告

2021年7月14日（水）午後8時25分より豊島区薬業会館にて理事会が開催されました。

出席者：佐野会長 伊原副会長 佐藤副会長 江村副会長 田崎常務理事 元谷常務理事
前原常務理事 南出常務理事 黒須理事 林理事 内山理事 原嶋理事 小林理事
大澤監事

○報告事項

1. 東京都薬剤師会「地区及び職域薬剤師会会長会」資料報告
2. 学術・DI 担当報告
3. 防災公衆衛生担当報告
4. 総務・会計担当報告
5. 保険担当報告
6. 地域医療担当報告
7. 池袋あうる薬局担当報告
8. 高齢者服薬情報提供事業報告
9. 新型コロナウイルスワクチン配付報告
10. 豊島区医師会 新役員就任報告

○協議事項

1. 理事担当（職掌分担）の件
「地域医療」事業の「医療・介護連携」の担当に黒須理事が加入することとなった。
2. 事業内容・計画の件
「地区研修会」「薬剤師研修会」「学術勉強会」「OTC 研修会」「公開講座」「健康展」「薬薬連携」「医療・介護連携」について、年間計画を作成して進めていくことが決定された。
3. 令和3年度公開講座の件
今年度は10月度のみに実施することが決定された。
4. 健康展の件
令和3年度の健康展の実施について諮られ、新型コロナウイルス感染予防を考慮しながら実施の方向で進めていくことが承認された。
5. 日薬大会の件
令和3年度の日本薬剤師会学術大会の参加について、暫定的に4名の理事が現地参加をすることが決定された。
6. 定款の改定の件
定款の改定の日付の記載について、最後部に記載することが承認された。
7. 令和3年度予算の明細の期間の訂正の件
令和3年度予算の明細の期間の訂正が承認された。
8. 薬業会館の備品の買替及び購入の件
薬業会館の備品について、机、椅子の買替及びプロジェクター、スクリーンの購入が承認された。

豊島区薬剤師会の活動（6月）

- 6／ 2 豊島区とのワクチン配付委託契約打合せ
- 3 豊島区医師会包括圏域 多職種連携の会
- 4 豊島区薬剤師会 監査会
- 9 レセプト受付
豊島区薬剤師会 理事会
- 12 東京都薬剤師会 地区及び職域薬剤師会会長会
- 15 豊島区薬剤師会 勉強会
- 16 池袋あうる薬局運営委員会
- 22 菊かおる園地区懇談会 ネットワーク部会
- 23 西部地区多職種連携の会（講演会・シンポジウム）
- 25 豊島区薬剤師会 通常総会

医薬品分割販売利用案内

令和元年10月

公益社団法人豊島区薬剤師会 会長
豊島区医薬品・情報管理センター センター長

※要遮光の医薬品（散剤、顆粒、ドライシロップ、水剤）について、仕切り書と薬ラベルに「遮光」と記載することにしました。保存に関しては各薬局にて管理をお願いいたします。

1. 分割販売品目

医薬品約1800品目、投薬ビン・軟膏壺などの医療材料

豊島区薬剤師会ホームページに販売品目リストを掲載しております。

2. 販売単位

錠剤・カプセル	1錠・1カプセル単位
散剤・顆粒・ドライシロップ	1g単位（バラ）、1包単位（分包品）
水剤	1ml単位（バラ）、1包単位（分包品）
軟膏・クリーム	1g単位（バラ）、1本単位（チューブ）
点眼・点耳・吸入	1本単位
ハップ剤	1袋単位
坐剤	1個単位
医療材料等	1個単位

容器が必要な場合は、所定の容器（有料）を使用いたします。

3. 販売価格

医薬品	薬価（消費税込）
その他（医療材料等）	取扱品目リストに掲載

4. 手数料

豊島区薬剤師会 会員	無 料
区外 東京都薬剤師会 会員	1回 110円（消費税込）
その他医療機関	1回 2200円（消費税込）

5. 検収・返品

医薬品受領時に必ずご確認いただき受領印もしくは自署をお願いいたします。
品質管理上、返品はできません。
ただし、メーカー回収の場合は、この限りではありません。

※使用期限が2ヵ月未満の場合は事前に確認の連絡をさせていただきます。
2ヵ月以上でも期限の確認が必要な方は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。

6. 発注方法

- 注文方法 : 専用の発注書に必要事項を記入のうえ、FAXにてご注文ください。
(電話での注文はお受けしていません。)
- 受付時間 : 9時 から 16時30分 月曜日～土曜日
- 受取時間 : 9時 から 17時 月曜日～金曜日
9時 から 21時30分 土曜日・日曜日・祝日

※年末年始、棚卸等により臨時休業する場合があります。(ホームページでご確認ください)
※指定の発注書は、ホームページよりダウンロードできます。

7. 利用者の確認事項

初回利用時には、開設許可証の写しをご提出いただきます。
また、都薬の会員証をお持ちの方は会員証の写しもお提出ください。
なお、豊島区薬剤師会会員の方は提出不要です。

その他開設許可更新等、管理センターが開設許可証の確認が必要と判断した場合には、再度ご提出いただくことがあります。

8. 支払い方法

豊島区薬剤師会会員は、原則として月末日締め「翌月口座引落」となります。
その他の方は、「薬品受け取り時に現金支払い」となります。

- * 管理センターでは、会員様の要望のあるものにつきまして、取り扱いを検討し、採用するか否かを決定する資料として使用します。つきましては下の要望書に記入し、あうる薬局に提出してください。FAXでかまいません。
- * 集計管理上、1枚1品目とし、複数の場合はコピーしてお使いください。

.....(きりとり).....

医薬品管理センター取り扱い要望書

令和 年 月 日

薬局名 _____ 印 _____

以下の製品の取り扱いを要望します

製品名 _____ 規格 _____

管理センター取り扱いリスト追補

* 新規取り扱い（過去に中止または停止したものの再開、リスト作成時に漏れたものも含む）

	製品名	小分単 位	備考
内	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	錠	
内	ウェールナラ配合錠	錠	
内	オングリザ錠5mg	錠	
内	クレンブテロール錠10 μ g「ハラサワ」	錠	
内	コランチル配合顆粒1g	包	
内	ズファジラン錠10mg	錠	
内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」	錠	
内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	錠	
内	パロキセチン錠10mg「アスペン」	錠	
内	フェロミア錠50mg	錠	
内	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	錠	
外	エコリシン眼軟膏3.5g	本	
外	トプシムローション0.05%10g	本	
外	トラチモ配合点眼液「ニットー」2.5ml	本	
外	フェルビナクテープ35mg「三笠」14枚	袋	
外	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」5ml	本	

* 取り扱い中止

	製品名	備考
内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	
内	ジゴシン散0.1%	
内	ヒルナミン錠50mg	
内	メマリー錠10mg	
外	アドエア500ディスカス60吸入用	
外	オドメール点眼液0.02%	
外	スミルテープ35mg	
外	ベストロン耳鼻科用1%	

3 都薬会発第 128-2 号
令和 3 年 7 月 10 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会
会長 永田 泰造

「居宅療養管理指導マニュアル 第 4 版」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会では、(株)じほう発行の「居宅療養管理指導マニュアル 第 3 版」を斡旋しておりますが、この度内容の改訂が図られ、「第 4 版」が発刊されることになり、引き続き下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

なお、頁数の増加に伴い、価格が変更されております。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

記

1. 名 称 : 「居宅療養管理指導マニュアル 第 4 版」
2. 発 行 : 株式会社 じほう
3. 判 型 : A4 判 、128 頁
4. 価 格 : 定 価 3,300 円(税込)
 会員価格 2,970 円(税込)
5. 送 料 : 地区薬剤師会宛 無 料
 個人・薬局宛 10冊未満 550円
 個人・薬局宛 10冊以上 無 料
6. 申 込 先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
7. 申 込 方 法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
8. 送 金 方 法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。
 本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて
 払込送金をお願いいたします。

地区薬剤師会
東京都薬剤師会
(いずれかを○で囲って下さい)

御中

幹旋図書 申込書

3 都薬会発第 128 号【3 年 7 月版】

★上記薬剤師会のいずれかにお申し込み下さい。(申込先によりご負担いただく送料が異なります 送料欄参照)

申込年月日		年 月 日
書籍届け先	薬局名 又は 地区薬剤師会名	※ 地区薬剤師会が一括申込をされる場合は地区名のみご記入ください
	住所	〒 _____ ※地区薬剤師会事務所の場合は記入不要
請求先住所		〒 _____ ※上記と同じ場合は記入不要
TEL		()
FAX		()
御担当者氏名		

該当書籍並びに別送いたします請求書の到着まで、このお申込書は大切に保管願います。

No.	出版社名	書籍名	幹旋価格 (消費税込)	+ 送料(税込)	部数
1	じほう	「第十八改正日本薬局方(条文)」 (定価 33,000 円) 7月中旬予定	29,700	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 " 10 冊以上 無料	
2	じほう	「第十八改正日本薬局方(条文)」と 「第十八改正日本薬局方 医薬品情報 JPDI2021」 セット版 (定価 38,500 円) 7月中旬予定	34,650	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 " 10 冊以上 無料	
3	じほう	「居宅療養管理指導マニュアル第 4 版」 (定価 3,300 円)	2,970	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 " 10 冊以上 無料	
4					
5					

※ 他の幹旋刊行物につきましては『日本薬剤師会雑誌』掲載の“日薬刊行物等のご案内”欄をご覧ください

★申込は、所属の地区薬剤師会事務局 もしくは下記の東京都薬剤師会事務局までお願いします。

問合先 : 事務局 薬局業務課・書籍担当
公益社団法人 東京都薬剤師会
TEL 03(3294)0271